

Siapton®

Nutriente biológico de rápida absorción

Vía suelo



Gowán[®]
ESPAÑA

- ✓ **Proceso de fabricación, exclusivo** de GOWAN, que permite asegurar un producto de **alta calidad**.
- ✓ EFICACIA y SEGURIDAD en los resultados, al tener una **composición constante y equilibrada**.
- ✓ **Normaliza el equilibrio hídrico y nutricional** de la planta en situaciones de estrés (heladas, pedrisco, sequía, encharcamiento).
- ✓ Aumenta la **resistencia** de la planta a la penetración de **agentes patógenos**.
- ✓ **Mejora** la floración, fructificación y cuajado de los frutos.
- ✓ Potencia la **adherencia** y la **velocidad de penetración** de los productos fitosanitarios con los que se combina
- ✓ Mejora la **selectividad** de los productos fitosanitarios, facilitando la recuperación del cultivo ante el eventual daño.
- ✓ **Aumenta** la eficacia de aplicaciones con micronutrientes, al formar complejos quelatados con elementos minerales como el hierro, que se bloquean fácilmente en el suelo.
- ✓ En **aplicaciones al suelo**, se absorbe rápidamente por la raíz, mejora la actividad microbiana, la movilidad y absorción de nutrientes.

- Mejora la estructura del suelo, capacidad de retención de agua y aireación.
- Aumenta la **capacidad de intercambio catiónico**.
- Aporta nitrógeno orgánico que se absorbe rápidamente por la planta.
- Potencia la utilización por la planta de otros componentes de la materia orgánica como son azúcares, polifenoles, etc.

Usos autorizados, dosis y momentos de aplicación

Dosis: Éstos son solo unos casos de uso a modo de ejemplo. Para mas información, pregunte al servicio técnico.

	Tomate	15-20.000 plantas/Ha	14-16 l/Ha
		Primer riego (trasplante)	0,2 cc/planta
		Engorde del primer ramillete	0,2 cc/planta
		Cada 15 días (mínimo 5 aportaciones)	0,1 cc/planta
	Alcachofa	10-12.000 plantas/Ha	15-20 l/Ha
		Primer riego	0,4 cc/planta
		Al aparecer la guía de producción	0,4 cc/planta
		Cada 15 días (mínimo 4 aportaciones)	0,2 cc/planta
	Lechuga	60-70.000 plantas/Ha	10-12 l/Ha
		Primer riego (trasplante)	0,5 cc/10 plantas
		Engorde deformación del cogollo	0,4 cc/10 plantas
		Cada 10 días (mínimo 3 aportaciones)	0,4 cc/10 plantas
	Pimiento	20-25.000 plantas/Ha	18-23 l/Ha
		Primer riego (trasplante)	0,2 cc/planta
		Engorde primeros frutos	0,2 cc/planta
		Cada 15 días (mínimo 5 aportaciones)	0,1 cc/planta
	Brócoli	40-50.000 plantas/Ha	12-15 l/Ha
		Primer riego (trasplante)	0,5 cc/10 plantas
		Formación de botón	0,4 cc/10 plantas
		Cada 15 días (mínimo 4 aportaciones)	0,4 cc/10 plantas
	Cítricos	En combinación con Vanguard®	5 l/Ha por aplicación
	Frutales	En combinación con Vanguard®	5 l/Ha por aplicación

SIAPTON®
Producto y marca registrada de GOWAN.

VANGUARD®
Producto y marca registrada de Laboratorios JAER, S.A.

GOWAN®
ESPAÑA

www.gowan.es



Visite nuestro canal de YouTube

Use los productos fitosanitarios de manera segura y solo en caso de necesidad. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.